

FORMIVAR

ad us. vet., Solution

Acide formique pour le traitement de la varroase chez l'abeille mellifère. **Pour diffuseur Liebig**

Période d'application

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1. Préparer

Le papier buvard est préparé en fonction de la température journalière et type de ruche puis posé sur la plaque de base.



2. Remplir

Retirez le goutte à goutte et remplir le diffuseur avec la quantité nécessaire puis repositionner le goutte à goutte.



3. Poser

Placez le diffuseur sur la plaque de base avec le papier buvard. L'acide formique coule par le goutte à goutte et se répartit sur la surface du papier buvard.

Formivar 60% et 85% doit toujours être utilisé en combinaison avec le diffuseur Liebig. Grâce au diffuseur, la répartition de l'acide formique est continue et régulière. L'intensité de l'évaporation est réglée par la taille du papier buvard.

- Agit rapidement et efficacement jusque dans les couvains operculés
- En cas de forte et très forte infestation de varroas (> 10 varroas morts par jour)
- Réglage du papier buvard, vert pour 60% et rouge pour 85%
- Toujours ouvrir entièrement le trou d'envol
- Nourrir brièvement avant le début du traitement
- Premier traitement après la récolte de miel, deuxième traitement après le nourrissage en septembre
- Le traitement est terminé lorsque le papier buvard est sec

Dosage

- Formivar 60%, 1l pour 5–10 colonies
- Formivar 85%, 1l pour 5–20 colonies

FORMIVAR

ad us. vet., Solution

Acide formique pour le traitement de la varroase chez l'abeille mellifère. **Pour diffuseur FAM**

Période d'application

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1. Imbiber

Versez Formivar 70% dans un godet puis imbiber l'éponge.



2. Ajuster

Régler le niveau d'ouverture du disque rotatif en fonction de la température journalière attendue.



3. Déposer

Placez le disque rotatif sur deux tasseaux ouverture vers le bas pour une évaporation optimale .

Utilisez toujours Formivar 70% en combinaison avec le diffuseur FAM. Grâce au diffuseur la répartition de l'acide formique est continue et régulière.

- Nourrir brièvement avant le début du traitement
- Agit rapidement et efficacement jusque dans les couvains operculés.
- En cas de forte et très forte infestation de varroas (> 10 varroas morts par jour)
- Premier traitement après la récolte de miel pendant 7 jours
- Après le nourrissage, deuxième traitement en septembre pendant 14 jours

Dosage

- 130 ml par application
- réglage simple grâce au disque rotatif pour une évaporation adaptée en fonction des températures
- Formivar 70%, 1l pour 7 colonies